

SPRYCEL

Dasatinib

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il est disponible dans les pharmacies de ville.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Cinq présentations sont disponibles, sous plaquettes unidoses :

- boîte de 60 comprimés pelliculés ronds blancs à 20 mg
- boîte de 60 comprimés pelliculés ovales blancs à 50 mg
- boîte de 60 comprimés pelliculés ronds blancs à 70 mg
- boîte de 30 comprimés pelliculés ovales blancs à 100 mg
- boîte de 30 comprimés pelliculés ronds blancs à 140 mg

Conservez ce médicament à température ambiante (moins de + 30°C), à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité, et hors de portée des enfants.

POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle. L'administration se fait en une ou deux prises par jour.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin. Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effet Indesirable	Prevention	
Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Lavez vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre supérieur à 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Diminution des plaquettes	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ...	En cas de saignement important, contactez le médecin prescripteur.
Eruption cutanée, démangeaisons	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil	En cas de symptômes persistants, prévenir le médecin prescripteur.

Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Evitez les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Complication respiratoire	Des symptômes respiratoire non spécifiques tels qu'une toux ou une difficulté à respirer peuvent survenir	Informez votre medecin dès la survenue de ces symptômes. Une adaptation du traitement sont à envisager.
Œdème des membres, prise de poids, jambes lourdes	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés.	Surveillez le poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin.
Arthralgie, myalgie	Evitez les gestes répétitifs.	Paracétamol. Prévenez votre médecin si persistance.

L'apparition de fatigue, de céphalées, de douleurs abdominales est très fréquente. La survenue d'une hypertension artérielle pulmonaire est possible. Un bilan hépatique est conseillé du fait d'un risque d'élévation des transaminases.

CONSEIL PRISE

La prise se fait à l'aide d'un grand verre d'eau indifféremment au cours ou en dehors de repas, mais de manière identique. Prise le matin et/ou le soir, toujours au même moment .

RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS

- Evitez de manger des pamplemousses ou de boire du jus de pamplemousse tout au long de votre traitement par SPRYCEL.
- Evitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac. Si besoin, demandez conseil à votre pharmacien.
- Ne pas broyer ni couper les comprimés.
- Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés
- Ne pas laisser à portée des enfants
- Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rappez les à votre pharmacien.
- Le dasatinib ne doit pas être utilisé durant la grossesse à moins d'une nécessité absolue. En cas d'utilisation pendant la grossesse, la patiente doit être informée du risque potentiel pour le fœtus. L'allaitement doit être interrompu durant le traitement
- Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Sprycel, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.
- Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin

prescripteur.

- Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle. En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).

CONDITIONS DE CONTACT

- signes infectieux (fièvres, toux, frissons)
- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang
- difficulté à respirer, toux anormale, essoufflement à l'effort ou douleur thoracique