

CASODEX

Bicalutamide

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (LISTE I). Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible sous plaquettes thermoformées :

- boîte de 30 comprimés enrobés blancs dosés à 50 mg.

Conservez ce médicament à température ambiante (inférieur à 30°C), à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité, et hors de portée des enfants.

POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle, selon l'indication elle peut être de 50mg/jour ou de 150 mg/jour

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin. Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effet Indesirable	Prevention	
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Evitez les aliments fris, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Bouffées de chaleur, transpiration accrue	Evitez les déclencheurs comme l'alcool, la caféine, le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress et la chaleur.	Faites des exercices légers (marche). Restez au frais. Portez des vêtements légers. Buvez régulièrement de l'eau.

Un gonflement et des douleurs à la poitrine peuvent survenir.

CONSEIL PRISE

Le CASODEX® se prend avec un grand verre d'eau, avec ou sans aliment. Il peut se prendre le matin ou le soir, mais toujours au même moment de la journée

RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS

- Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Ne pas laisser à portée des enfants.
- Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.
- Evitez de boire de l'alcool pendant le traitement.
- Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.
- Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Casodex, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.

CONDITIONS DE CONTACT

- signes infectieux (fièvres, toux, frissons)
- démangeaison, douleurs abdominales, coloration foncée des urines
- bleuissement de la peau
- douleur adominale, démangeaison, jaunissement de la peau ou urines foncées