

CELLTOP

Etoposide

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il est disponible dans les pharmacies de ville.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Trois présentations sont disponibles, sous plaquettes thermoformées:

- Boîte de 40 capsules dosées à 25 mg;
- Boîte de 20 capsules dosées à 50 mg.

A conserver à T inférieur à 25 °C, dans l'emballage d'origine.

POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle. Le traitement sera adapté selon votre état et votre posologie par le médecin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin. Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effet Indesirable	Prevention	
Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Lavez vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre supérieur à 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Diminution des plaquettes	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ...	En cas de saignement important, contactez le médecin prescripteur.
Plaies douloureuses dans la bouche	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool. Humidifiez la bouche avec un vaporisateur.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez le médecin prescripteur.

Une perte de cheveux peut survenir, cet effet est réversible à la fin du traitement.

CONSEIL PRISE

Les capsules doivent être absorbées entières à l'aide d'un verre d'eau, en 2 à 3 prises par jour, au cours ou en dehors d'un repas. Elles ne doivent pas être ouvertes, mâchées ou écrasées. Préférer le fractionnement en faibles doses (prise 2 ou 3 fois par jour si besoin). Les capsules ne sont pas sécables: si une adaptation posologique est nécessaire, tenir compte des différents dosages disponibles ou adapter la dose sur plusieurs jours (exemple : 85 mg/j pendant 3 jours = 255 mg : administrer 100 mg à J1, 100 mg à J2 et 50 mg à J3).

RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS

- Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des capsules. (Si vous avez été en contact direct avec le contenu de la capsule, rincez-vous abondamment à l'eau et prévenez le médecin). Ne pas utiliser une capsule endommagée.
- Ne pas laisser à portée des enfants.
- Ne pas jeter les emballages ni les capsules dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.
- La grossesse et l'allaitement sont contre-indiqués pendant le traitement par etoposide. Utilisez une méthode de contraception efficace.
- Si vous avez oublié de prendre vos capsules d'etoposide, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.
- Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.
- En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).
- Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.

CONDITIONS DE CONTACT

- signes infectieux (fièvres, toux, frissons)
- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang